Baftas(R) Gel Aftas

Ingeniería de Tejidos aplicada a la Mucosa Oral

DESCRIPCIÓN

Baftas(R) Gel Aftas es un gel gingival con Ácido Hialurónico al 0.2% y matriz bioadhesiva inteligente que actúa como un "apósito biológico", aislando la lesión y acelerando la reparación celular. Crea una película mucoadhesiva resistente que no se lava con la saliva, proporcionando alivio del dolor inmediato y sostenido.

COMPOSICIÓN

Ingrediente	Concentración	Función
Ácido Hialurónico	0.2%	Principio activo regenerador
PVM/MA Copolímero	-	Agente bioadhesivo
Sorbitol	c.s.	Humectante
PEG-40 Aceite de Castor Hidrog.	c.s.	Solubilizante
Hidroxietilcelulosa	c.s.	Espesante
Metilparabeno Sódico	c.s.	Conservante
Benzoato Sódico	c.s.	Conservante
Ácido Cítrico	c.s.	Regulador de pH
Propilparabeno Sódico	c.s.	Conservante
Sacarina Sódica	c.s.	Edulcorante

BENEFICIOS PRINCIPALES

- **Barrera Protectora:** Crea una película mucoadhesiva resistente que se fija a la encía húmeda.
- **Regeneración Acelerada:** Activa la migración de fibroblastos para acelerar la cicatrización.
- **Mejora el Alivio:** Reduce el edema y eritema, proporcionando alivio del dolor sostenido.
- No se lava con la saliva, permitiendo al paciente comer y hablar sin molestias.

MODO DE USO

- **Aplicación:** Aplicar pequeña cantidad de gel con el dedo limpio o cánula sobre la zona afectada.
- **Masajear Suavemente:** Durante más de un minuto para favorecer absorción y fijación.
- **Frecuencia:** Repetir 2 o 3 veces al día.
- **Precaución:** Dejar actuar sin comer ni beber durante al menos una hora. No enjuagar.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- **Úlceras Bucales:** Tratamiento de aftas recurrentes con alivio inmediato y cicatrización acelerada.
- **Heridas por Ortodoncia:** Lesiones traumáticas por brackets y alambres con protección mecánica.
- **Lesiones por Prótesis:** Heridas causadas por roce de prótesis dentales extraíbles.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No enjuagar después de la aplicación.
- Esperar al menos una hora antes de ingerir alimentos o bebidas.
- Haga caso a su doctor y siga las indicaciones prescritas.