Nedento(R) C Cirugía

La Revolución de la Cicatrización Periodontal

DESCRIPCIÓN

Nedento(R) C Cirugía Gel acelera la cicatrización de las encías reduciendo la inflamación y las molestias asociadas y controlando los microorganismos. Sus excipientes bioadhesivos logran una máxima adherencia que contribuye a una mayor eficacia y duración de los efectos del producto. Formulado con ácido hialurónico y clorhexidina, el agente antiplaca más efectivo.

COMPOSICIÓN

Ingrediente	Concentración	Función
Ácido Hialurónico	0.2%	Cicatrizante / Regenerador
Digluconato de Clorhexidina	0.2%	Antiséptico antiplaca
PVM/MA Copolímero	-	Polímero bioadhesivo
Sorbitol	c.s.	Humectante
Hidroxietilcelulosa	c.s.	Espesante / Bioadhesivo
PEG-40 Aceite de Castor Hidrog.	c.s.	Solubilizante
Metilparabeno Sódico	c.s.	Conservante
Sacarina Sódica	c.s.	Edulcorante
Propilparabeno Sódico	c.s.	Conservante
Ácido Cítrico	c.s.	Regulador de pH

BENEFICIOS PRINCIPALES

- **Protección Antimicrobiana:** Clorhexidina 0.2% como Gold Standard antiséptico.
- **Regeneración Acelerada:** Ácido Hialurónico como andamio biológico que acelera cicatrización.
- **Acción Prolongada:** PVM/MA Copolímero crea película protectora duradera sobre la herida.

MODO DE USO

- Aplicar pequeña cantidad de gel con el dedo o la cánula sobre la zona afectada (surco gingival).
- Masajear suavemente durante 2 minutos para formar película protectora sobre la encía.
- Frecuencia: 2 o 3 veces al día.
- No comer ni beber durante al menos una hora después de la aplicación.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- **Cirugías Periodontales:** Acelera la cicatrización y reducción de inflamación post-operatoria.
- **Tratamientos Preimplantarios:** Preparación y cuidado del tejido gingival.
- **Terapia de Mantenimiento:** Seguimiento de tratamientos quirúrgicos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No enjuagar después de su aplicación.
- No ingerir.
- Haga caso a su doctor y siga las indicaciones de uso prescritas.