# Nedento(R) Encías

*Más que Clorhexidina: La Evolución de la Terapia Periodontal*

## DESCRIPCIÓN

Nedento(R) Encías es el antiséptico de elección para el tratamiento de la enfermedad periodontal. Con Clorhexidina (0.2% en gel y 0.12% en enjuague), logra una reducción de placa y gingivitis hasta del 60%. Complementado con Vitamina B5, Alantoína y Vitamina E para triple efecto terapéutico: antiséptico, antiinflamatorio y cicatrizante. Fórmula sin alcohol con Excipiente Bioadhesivo Plus para acción Retard.

## PRESENTACIONES

- **Gel Gingival (30 ml):** Clorhexidina 0.2% - Para tratamiento localizado.
- **Enjuague Bucal (300 ml):** Clorhexidina 0.12% - Para tratamiento generalizado.

## COMPOSICIÓN

| Ingrediente | Concentración | Función |
|---|---|---|
| Clorhexidina (DCI) | 0.2% / 0.12% | Antiséptico de amplio espectro |
| Vitamina B5 (Pantenol) | 1.0g | Regenerador tisular |
| Alantoína | 0.2g | Estimula cicatrización |
| Vitamina E | 0.2g | Antioxidante protector |
| Excipiente Bioadhesivo Plus | c.s. | Liberación prolongada (Retard) |

## BENEFICIOS PRINCIPALES

- **Triple Acción:** Antiséptico + Antiinflamatorio + Cicatrizante.
- **Acción Retard:** 30% del principio activo se retiene en cavidad oral, liberándose lentamente.
- **Sin Alcohol:** Máxima tolerancia en mucosas sensibilizadas.

## MODO DE USO

Gel (Gingivitis Localizada):

- Aplicar tópicamente con cánula o cepillo suave, 2-3 veces al día.

Enjuague (Gingivitis Generalizada):

- 15 ml sin diluir, mantener en boca 30-60 segundos, 2-3 veces al día.
- No ingerir líquidos ni alimentos durante los 30 minutos posteriores.

## INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- **Periodoncia:** Reducción intensa del índice de placa y gingivitis.
- **Cirugía Periodontal:** Protege área suturada y previene infección.
- **Implantología:** Favorece cicatrización en colocación de implantes.
- **Exodoncia:** Reduce riesgo de alveolitis post-extracción hasta 56%.
- **Halitosis:** Reduce carga bacteriana y compuestos sulfurados volátiles.
- **Ortodoncia:** Cicatrización de ulceraciones y control de gingivitis.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Contraindicado en hipersensibilidad a la clorhexidina.

- No usar con lauril sulfato de sodio (inactivante).
- Puede aparecer tinción dental reversible tras uso prolongado.
- Embarazo y lactancia: uso restringido salvo criterio facultativo.
- Haga caso a su doctor y siga las indicaciones prescritas.