Nedento(R) Triclosán

El Estándar de Oro en Mantenimiento Gingival Diario

DESCRIPCIÓN

Nedento(R) Triclosán es la línea de mantenimiento periodontal diario. Combina Triclosán de acción prolongada con agentes antiinflamatorios, cicatrizantes y regeneradores. Fórmula sin alcohol con Excipiente Bioadhesivo Plus para acción Retard. No genera manchas extrínsecas como otros antisépticos.

PRESENTACIONES

- **Pasta Dentrífica (75 ml):** Triclosán 0.30% + Fluoruro Sódico 0.32g.
- **Enjuague Bucal (300 ml):** Triclosán 0.15% + Fluoruro Sódico 0.05g.

COMPOSICIÓN - PASTA

Ingrediente	Concentración	Función
Triclosán	0.30%	Antiséptico de amplio espectro
Fluoruro Sódico	0.32g	Anticaries de máxima actividad
Vitamina B5	1.0g	Regenerador tisular
Alantoína	0.20g	Estimula cicatrización
Aloe Vera	0.1g	Antiinflamatorio natural
Excipiente Bioadhesivo Plus	c.s.	Acción Retard

COMPOSICIÓN - ENJUAGUE

Ingrediente	Concentración	Función
Triclosán	0.15%	Antiséptico de amplio espectro
Fluoruro Sódico	0.05g	Anticaries
Vitamina B5	1.0g	Regenerador tisular
Alantoína	0.2g	Estimula cicatrización
Excipiente Bioadhesivo Plus	c.s.	Acción Retard

BENEFICIOS PRINCIPALES

- **Uso Diario Seguro:** Sin alcohol, sin riesgo de resistencias ni tinciones.
- **Acción Prolongada:** Tecnología Bioadhesiva Plus fija principio activo a la mucosa.
- **Complejo Regenerador Triple:** B5 + Alantoína + Aloe Vera.
- **Flúor de Máxima Actividad:** Protección anticaries con fluoruro sódico.

MODO DE USO

Pasta:

- Cepillar dientes y encías 3 veces al día durante 3 minutos.

Enjuague:

- 15 ml sin diluir, mantener en boca 30-60 segundos, 2-3 veces al día.
- No ingerir alimentos ni bebidas durante 30 minutos posteriores.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- **Periodoncia:** Fase de mantenimiento en enfermedad periodontal.
- **Gingivitis:** Tratamiento y prevención con acción antiinflamatoria continua.
- **Control de Placa:** Reducción demostrada del 20-30%.
- **Prevención de Caries:** Fluoruro Sódico de alta disponibilidad.
- **Ortodoncia:** Control de placa durante tratamiento ortodóntico.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Contraindicado en hipersensibilidad a los componentes.
- Embarazo y lactancia: no administrar (medida de precaución).
- Haga caso a su doctor y siga las indicaciones prescritas.